




<div><div>CARRIÓN DANILO COPIN Secretario de Salud</div></div>		FORMATO											CÓDIGO	GC-96-F2
		TABLERO DE INDICADORES											VERSIÓN	6
													VIGENCIA	18/05/2021
		PAGINA 1 DE 1												
No.	NOMBRE DEL INDICADOR	META	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1	P.1.1 Proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación.	85%	87%	84%	86%	92%	94%	90%	90%	90%	92%	86%	93%	93,2%
2	Incidencia de sífilis congénita en partos atendidos en la ESE.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
3	Adherencia a la guía de atención de enfermedad hipertensiva.	90%	93%	93%	93%	97%	93%	90%	87%	90%	93%	90%	97%	93,3%
4	P.2.13 proporción de reingresos de pacientes al servicio de urgencias en menos de 72 horas.	1,8	1,7	1,4	1,3	1,2	1,4	1,6	0,7	0,9	0,7	1,8	2,1	2,1
5	P.3.1 tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina general.	3 DIAS	#¡REF!	2,56	2,68	3,07	2,74	2,58	2,21	3,91	5,07	3,46	4,74	4,74
6	P.1.2 proporción de gestantes con valoración por odontología.	85%	98%	98%	94%	91%	90%	85%	85%	81%	81%	81%	87%	81,9%
7	P.1.4 tasa de mortalidad perinatal.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
8	P.3.3 tiempo promedio de espera para la asignación de cita de medicina Interna.	10 DIAS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2,8	2,5	9,4	13,4	16,7	7,5	11,0	11,0
9	P.3.5 tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Ginecología.	10 DIAS	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	2,0	1,7	5,9	17,3	16,3	4,8	22,4	22,4
10	P.1.5 relación morbilidad materna extrema / muerte materna temprana (MME/MM).	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
11	P.1.6 proporción de recién nacidos con tamizaje para hipotiroidismo.	95%	#¡DIV/0!	100,0%	#¡DIV/0!	66,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%
12	P.1.7 proporción de reingreso hospitalario por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años.	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
13	P.1.8 letalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años.	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
14	P.1.9 letalidad en menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda.	0	0,0%	80,0%	73,7%	72,9%	#¡REF!	0,0%	0,0%	50,0%	#¡REF!	0,0%	0,0%	0,0%
15	P.1.10 proporción de gestantes con asesoría pre test para prueba de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).	100%	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%
16	P.1.12 proporción de mujeres a las que se le realizó toma de serología en el momento del parto o aborto.	90%	N/A	100,0%	N/A	100,0%	50,0%	100,0%	83,3%	90,9%	85,7%	90,0%	62,5%	85,7%
17	P.1.14 proporción de personas con hipertensión arterial a quienes se les realizó medición de LDL.	90%	72,8%	75,3%	75,4%	69,0%	58,0%	83,7%	56,3%	64,4%	69,5%	69,1%	73,7%	73,6%
18	P.1.15 proporción de personas con diabetes a quienes se les realizó toma de hemoglobina glicosilada en el último semestre.	90%	73,7%	75,1%	73,5%	54,2%	35,8%	62,0%	71,3%	55,1%	60,9%	65,4%	68,5%	70,2%
19	P.1.16 proporción de personas con diabetes mellitus a quienes se les realizó medición de LDL.	80%	73,7%	72,9%	76,6%	68,6%	59,5%	50,0%	59,3%	63,2%	65,4%	64,5%	70,3%	72,4%
20	P.1.17 proporción de personas con hipertensión arterial (HTA) estudiadas para enfermedad renal crónica (ERC).	80%	77,0%	79,1%	78,8%	46,3%	61,3%	51,9%	64,9%	66,8%	65,6%	78,0%	86,5%	87,5%
21	P.1.18 proporción de personas con diabetes mellitus estudiadas para enfermedad renal crónica (ERC).	80%	79,5%	82,5%	81,7%	44,4%	63,4%	53,6%	59,7%	67,1%	66,2%	79,7%	88,3%	90,8%
22	P.1.23 proporción de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año.	80%	2,8%	5,2%	8,4%	10,9%	13,8%	16,2%	18,8%	22,8%	25,7%	29,0%	32,3%	83,4%
23	P.2.4 proporción de endometritis post parto vaginal.	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
24	P.2.6 tasa de caída de pacientes en el servicio de hospitalización.	0,1%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
25	P.2.7 tasa de caída de pacientes en el servicio de urgencias.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
26	P.2.8 tasa de caída de pacientes en el servicio de consulta externa.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
27	P.2.9 tasa de caída de pacientes en el servicio de apoyo diagnóstico y complementación terapéutica.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
28	P.2.10 Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en hospitalización.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

29	P.2.11 Proporción de eventos adversos relacionados con la administración de medicamentos en urgencias.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
30	P.2.12 tasa de úlceras por presión.	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
31	P.2.14 tasa de reingresos de pacientes hospitalizados en menos de 15 días.	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,8%	0,8%
32	P.3.2 tiempo promedio de espera para la asignación de cita de odontología general.	3 DIAS	2,7	2,5	2,4	2,3	2,0	2,0	1,6	2,6	2,8	5,4	6,8	6,8
33	P.3.4 tiempo promedio de espera para la asignación de cita de pediatría.	5 DIAS	P.1.16 proporción de personas con diabetes mellitus a quienes se les realiza medición de LDL.	0,8	#¡REF!	4,0	4,0	3,0	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	12,1	12,1
34	P.3.8 tiempo promedio de espera para toma de ecografía.	5 DIAS	P.1.16 proporción de personas con diabetes mellitus a quienes se les realiza medición de LDL.	0,8	#¡REF!	2,1	2,7	2,7	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!	6,5	6,5
35	P.3.10 tiempo promedio de espera para la atención del paciente calificado como triage 2.	30 MINUTOS	0:11:29	0:08:12	0:10:39	0:09:52	0:12:45	0:10:03	0:09:30	0:09:20	0:11:42	0:10:40	0:13:13	0:13:13
36	P.3.14 proporción de satisfacción global de usuarios de IPS.	95%	99,8%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
37	P.3.15 proporción de usuarios que recomendaría su IPS a un familiar o amigo.	95%	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%
38	E.2.11 Proporción de mujeres con citología cervicouterina anormal que son remitidas para toma de colposcopia.	80%	93,2%	89,9%	86,6%	91,3%	94,4%	85,3%	44,2%	32,5%	144,7%	83,6%	74,1%	62,8%